


# Hypovolemic shock

ကျွန်း ခြေစက်ကွေးစေခြင်း



## ကုသမှု

1. ၅% သို့မဟုတ် ၁၀% သို့မဟုတ် ၁၅% သို့မဟုတ် ၂၀% သို့မဟုတ် ၂၅% သို့မဟုတ် ၃၀% သို့မဟုတ် ၃၅% သို့မဟုတ် ၄၀% သို့မဟုတ် ၄၅% သို့မဟုတ် ၅၀% သို့မဟုတ် ၅၅% သို့မဟုတ် ၆၀% သို့မဟုတ် ၆၅% သို့မဟုတ် ၇၀% သို့မဟုတ် ၇၅% သို့မဟုတ် ၈၀% သို့မဟုတ် ၈၅% သို့မဟုတ် ၉၀% သို့မဟုတ် ၉၅% သို့မဟုတ် ၁၀၀% သို့မဟုတ် ၁၀၅% သို့မဟုတ် ၁၁၀% သို့မဟုတ် ၁၁၅% သို့မဟုတ် ၁၂၀% သို့မဟုတ် ၁၂၅% သို့မဟုတ် ၁၃၀% သို့မဟုတ် ၁၃၅% သို့မဟုတ် ၁၄၀% သို့မဟုတ် ၁၄၅% သို့မဟုတ် ၁၅၀% သို့မဟုတ် ၁၅၅% သို့မဟုတ် ၁၆၀% သို့မဟုတ် ၁၆၅% သို့မဟုတ် ၁၇၀% သို့မဟုတ် ၁၇၅% သို့မဟုတ် ၁၈၀% သို့မဟုတ် ၁၈၅% သို့မဟုတ် ၁၉၀% သို့မဟုတ် ၁၉၅% သို့မဟုတ် ၂၀၀% သို့မဟုတ် ၂၀၅% သို့မဟုတ် ၂၁၀% သို့မဟုတ် ၂၁၅% သို့မဟုတ် ၂၂၀% သို့မဟုတ် ၂၂၅% သို့မဟုတ် ၂၃၀% သို့မဟုတ် ၂၃၅% သို့မဟုတ် ၂၄၀% သို့မဟုတ် ၂၄၅% သို့မဟုတ် ၂၅၀% သို့မဟုတ် ၂၅၅% သို့မဟုတ် ၂၆၀% သို့မဟုတ် ၂၆၅% သို့မဟုတ် ၂၇၀% သို့မဟုတ် ၂၇၅% သို့မဟုတ် ၂၈၀% သို့မဟုတ် ၂၈၅% သို့မဟုတ် ၂၉၀% သို့မဟုတ် ၂၉၅% သို့မဟုတ် ၃၀၀%
2. ကျွန်းစက်ကွေးခြင်းကို ကုသရန် Hypovolemic shock
3. ချွေးစက်ကွေးခြင်းကို ကုသရန်
4. ချွေးစက်ကွေးခြင်းကို ကုသရန်
5. Record I/O
6. သွေးစစ်ဆေးမှု → Hct, Hb