

ประวัติ สาเหตุของภาวะเกิดภาวะช็อค
 ประวัติอาการของโรคที่มีเกี่ยวข้อง
 ลักษณะของเลือดออก
 ลักษณะของไข้
 ลักษณะของหัวใจ

เวลาช็อค, ท้องอ่อน
 Capillary refill time > 3 sec
 Urine output < 30 ml/hr

ภาวะช็อคแบบต่างๆ
 hypovolemic shock
 neurogenic shock
 septic shock
 ภาวะช็อคแบบอื่นๆ

cardiogenic shock
 anaphylaxis shock
 bronchospasm
 ศีรษะสูง 10°

ประวัติการแพ้ยาที่ใบกำกับยา
 • 1912 วัคซีนพิษบาดทะยัก
 • 1912 วัคซีนพิษบาดทะยัก
 • 1912 วัคซีนพิษบาดทะยัก
 • 1912 วัคซีนพิษบาดทะยัก


hospital phase

hemorrhage dehydration intravascular volume

100% O2 mask, Cannula
 30-40% endotracheal tube + ventilator
 ใช้ colloids ใช้ crystalloids
 ใช้สารน้ำ Crystalloids

การพยาบาล
 on scene

- scene size-up
- initial assessment
- วัดชีพจร วัดความดัน วัดอุณหภูมิ HR 4
- SBP > 80 mmHg
- ภาวะช็อคแบบต่างๆ
- ภาวะช็อคแบบต่างๆ
- ภาวะช็อคแบบต่างๆ
- ภาวะช็อคแบบต่างๆ



Cardiogenic shock
 ภาวะช็อคที่เกิดจากหัวใจล้มเหลว
 ภาวะช็อคที่เกิดจากหัวใจล้มเหลว

การพยาบาลภาวะช็อค
 ภาวะช็อคที่เกิดจากหัวใจล้มเหลว