

การระบาดของโรคทางเดินหายใจ

- ส่วนบน nasopharynx oropharynx larynx
- ส่วนล่าง Trachea Bronchi ปอดทั้ง 2 ข้าง
- อาการที่พบบ่อย ไอเป็นเลือด ไอ เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก ภาวะหัวใจล้มเหลว

นางสาว จุฑาทิพย์ อสุนี ณ อยุธา เลขที่ 5

614991006

การระบาดของโรคที่นำโดยแมลงและสัตว์

- ไข้เลือดออก
- ไข้สมองอักเสบ
- ไข้มาลาเรีย
- โรคสคับไทฟัส

ไข้หวัดใหญ่ Influenza

- เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza virus
- มี 3 สายพันธุ์ ได้แก่

 - 1 Influenza A
 - 2 Influenza B
 - 3 Influenza C

การแพร่ระบาดในระบบทางเดินอาหาร

- อาการ อาเจียน กลืนลำบาก ปวดท้อง ท้องเดิน
- ปวดท้อง Peptic ulcer Biliary colic
- ท้องเดิน ท้องเด็เฉียบพลัน ท้องเดินเรื้อรัง
- ท้องผูก ลำไส้อุดตัน มีไข้ขาดน้ำ

โรคไร้เชื้อ/เรื้อรัง โรคติดเชื้อ

โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

โรคอุบัติใหม่ - โรคติดเชื้อใหม่ระยะเวลา ประมาณ 20 ปี

โรคอุบัติซ้ำ- โรคที่เคยมีมานานมาแล้วกลับมา เป็นซ้ำอีก

ไข้หวัดสุกร H3N2

- แพร่จากคนสู่มู การกิน การสัมผัส
- ระยะฟักตัว 1-3 วัน
- อาการเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ อาการหายเอง 1 สัปดาห์
- รักษาแบบเดียวกับไข้หวัดใหญ่

โรคไร้เชื้อ / เรื้อรัง NCDs

เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น Ht DM โรคหลอดเลือดหัวใจ โรค หลอดลมโป่งพอง

การระบาดโดยการสัมผัส

- ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STIs หนองใน HIV