



**ไขหวัดใหญ่ (Influenza)**

- เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza Virus มี 3 สายพันธุ์
- Influenza A
- Influenza B
- Influenza C

**ไขหวัดสุกร H3N2**

- แพร่จากหมู → คน = จากทรนซ์ปะทอน ท่อตรสัมผัส
- ระยะฟักตัว 1-3 วัน
- มีอาการเช่นเดียวกับไขหวัดใหญ่, ตกรทพเอใน 1 week
- ใช้ยารักษาเดียวกับไขหวัดใหญ่



**การระบาทของหลอดเพนทชไล**

- ส่วนบน = nasopharynx, pharynx, larynx
- ส่วนล่าง = trachea, bronchi, ปอดทัว ๒ ซ้อ
- ตกรทพทงบ่งช = โย, โยเพนเลอด, เลชทพอด, ทชไลล้าชก

ทท: ทพไลล้าชก



**โรคอุบัติใหม่** : โรคติดเชือใหม่ ๆ ระยะเวลา: หลาย ๒๐ ปี

**โรคอุบัติซ้ำ** : โรคที่เคมมีเมื่อนานมาแล้ และ กลับมาเชือซ้ำอีก

**โรคเรื้อรัง/เรื้อรัง โรคติดเชือโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ**

**ทท: บทกของโรคที่ชชไลโดยแผลลวไล: สักร**

- ไข้เลือดออก
- ไข้สมองอัดเศช
- ไข้มาเลเรีย
- โรคสคชโกนัส

**โรคเรื้อรัง/เรื้อรัง NCDs**

= เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมจากการใช้ชีวิต

เช่น ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, คุรสลไป้วมอ, โรคทลชเคอคนน้ำ



**การแพร่ระบาทของโรคในระบทวเพนทชอาหาร**

- ตกร = ตเฉยช, กล่นล้าชก, ปากทอ, ทอเวน, ทอเวก
- ปากทอ = Peptic ulcer, Biliary colic
- Renal colic, เชื้อชชอทออดเศช
- ทอเวน = ทอเวนเชือชชพลัน, ทอเวนเรื้อรัง
- ทอเวก = มีไข้ขาดน้ำ, ล้าสัอดกล่น



**โรคติดเชือ**

- เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชือ = Virus, แบคทีเรีย, ปรลิต
- เชือโรคสามารถถ่ายทอได้ (Transmission)
- ติดทอโดยทาสัมผัสคลลคลลและแพร่ท: จาพสูผู้อื่นได้

เช่น ไรตไขล้ช้สน, โรคทัด, โทไขนัดใหญ่

**การ: ขาดโดยทาสัมผัส**

- ติดทอทวเพนล้ช้สน (STIs) = ๑นอเว, HIV

