น.ส.ปิยะฉัตร แสงศิริวุฒิ รหัส 5949991026 หมู่เรียน 59/36

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก

Oxygenation and tissue perfusion
การได้รับออกซิเจนและการมีเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อร่างกาย สัมพันธ์กับความดันซิสโตลิค (MAP) ซึ่งการที่จะบ่งบอกว่ามีแรงดันไปเลี้ยงเนื้อเยื่ออวัยวะอื่นๆได้โดยใช้ ค่า MAP คือ MAP ≥ 60 mm.Hg

ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาที

ขนาดของหลอดเลือด

ปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย

ค่าอื่นๆที่บ่งบอกว่ามีปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อของร่างกาย → pulse pressure อยู่ที่ 30-40 mm.Hg → CVP อยู่ที่ 8-12 mm.Hg ในผู้ป่วยที่ชายใจได้เอง 12-15 mm.Hg ในผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ → MAP 70-110 mmHg → BP 90-120/60-80 mm.Hg

การชดเชยภาวะช็อก
- การชดเชยภาวะช็อกโดยขับปริมาณเลือดออกจากร่างกาย ใช้ระบบควบคุมที่สำคัญๆ เช่น: ระบบประสาทซิมพาเทติก
- การชดเชยภาวะช็อกโดยการใช้สารน้ำหรือยาเพิ่มปริมาตรเลือด เช่น: การชดเชยแบบปริมาณสูง

obstructive shock เกิดจากมีสิ่งกีดขวางในหลอดเลือด หัวใจบีบตัว ↓ venous return, CO ↓ ตามในสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ภาวะหัวใจวายบีบตัวลดลง ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ ปอดอุดตัน เป็นต้น

Distributive shock
การทำงานของ sympathetic nervous system ลดลง ซึ่งมีผลทำให้ร่างกายขยายตัว ของหลอดเลือดขยาย-ตัวไม่สามารถหดตัวได้ดังเดิม venous return ลดลง CO ลดลง เลือดไปเลี้ยงอวัยวะลดลง ซึ่ง ชนิด septic shock, anaphylactic shock, neurogenic shock

ภาวะที่เนื้อเยื่อของร่างกายได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ ทำให้เซลล์ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ จนเกิดการทำงานล้มเหลวของอวัยวะในร่างกาย

ระยะของช็อก

1. initial stage เป็นระยะเริ่มต้นของภาวะช็อก ค่า MAP ลดจากปกติ < 10 mmHg ระยะนี้สามารถปรับตัวได้
2. non progressive stage เกิดเมื่อ MAP ลดลงจากปกติ 10-15 mmHg ร่างกายปรับตัวโดยใช้ฮอร์โมนมากขึ้น
3. progressive stage เกิดเมื่อ MAP ลดลง >20 mmHg จากปกติ และลดลงต่อเนื่อง
   - ร่างกายปรับตัวไม่ทัน
   - ไม่สามารถชักชาออกซิเจนที่ไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอ
4. refractory stage เกิดเมื่อระดับความเข้มข้นของออกซิเจนไปเลี้ยงเป็นเวลานาน จนเกิดการล้มเหลวของเนื้อเยื่อต่างๆ

1. อาการและอาการแสดง มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น HR ↑ RR ↑ systolic BP >90 mm.Hg
2. อาการและอาการแสดง Pt. ซึมลง ปัสสาวะน้อย มีความก้าวร้าว กระสับกระส่าย ผิวเย็นชื้น ตัวเขียว ชายใจเร็ว urine output ลดลง ↓ systolic BP ↓ diastolic BP ↑ pulse pressure ↓ มีอาการหอบเหนื่อย O2 sat ลดลง 2-5 %
3. อาการและอาการแสดง ภาวะเช่นเดียวกับ non progressive แต่รุนแรงกว่า Pt. สับสน ซึมลง ชีพจรเบาและเร็ว ปัสสาวะเริ่มหยุดชะงัก ผิวซีดจนเขียว ปัสสาวะไม่ออก มีภาวะ hyperkalemia
4. อาการและอาการแสดง Pt. ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดๆ ไม่ได้ หัวใจเต้นช้า ชีพจรเบา ชายใจตื้นช้า วัด O2 sat ไม่ได้

Hypovolemic shock
เกิดจากการสูญเสียปริมาณน้ำออกจากร่างกาย ด้วยปริมาณเสีย 750-1,500 ml. ทำให้เกิดภาวะช็อก
กลไกการเกิด เมื่อร่างกายสูญเสียเลือดหรือน้ำ ทำให้สารน้ำในระบบไหลเวียนโลหิตลดลง เลือดไหลกลับหัวใจ ↓ ส่งผล CO ↓ ทำให้เนื้อเยื่อของร่างกายขาดออกซิเจน

cardiogenic shock
เมื่อหัวใจบีบตัวลดลง มีการขยายตัวของห้องหัวใจ ↓ SV ↓ การบีบตัวของหัวใจไม่มีประสิทธิภาพ หัวใจบีบช้าลง
- CO ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อร่างกายลดลง ปริมาณเลือดที่ค้างในห้องหัวใจ เกิดการแข็งตัวของเลือดง่าย ทำให้การบีบตัวของหัวใจไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คือภาวะการเกิดช็อก